



# AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

## POITOU - CHARENTES

Bulletin Technique n° 16 du 01 Juin 2005 - 1 page

### Grandes Cultures

#### COLZA : Stade G4

Les pucerons sont rentrés dans le rang et la régulation naturelle se poursuit.

Les interventions sur micosphaerella brassicicola et oïdium ont été réalisées avec succès.

*Les traitements sur colza sont désormais inutiles et obsolètes.*

#### POIS : Stade gousses pleines

Les traitements pucerons ont été réalisés avec succès.

Le vol des tordeuses se confirme comme faible (moins de 700 captures).

*Les interventions sont maintenant inutiles.*

#### LUPIN d'hiver et de printemps

La surveillance de l'anthracnose de la rouille et du botrytis doit se poursuivre jusqu'au 10 juillet.

*Les cultures sont dans l'ensemble très saines et aucun traitement ne se justifie actuellement.*

#### BLE : Stade formation du grain à

amande aqueuse

Surtout en sols superficiels, le dessèchement des feuilles s'est accéléré suite aux fortes températures observées pendant plusieurs jours la semaine dernière (températures maxi de 30 à 32°).

#### Pucerons

Le vol à la tour est de faible intensité. En parcelles, les pucerons sont présents en général en faible nombre. Sauf cas particuliers, **moins de 20 % des épis sont colonisés** ; une **bonne activité des auxiliaires** est notée.

*Maintenir la surveillance jusqu'au stade laiteux-pâteux, c'est-à-dire pendant 2 à 3 semaines environ. Intervenir lorsqu'environ 1 épi sur 2 est porteur de pucerons.*

#### MAÏS : Stade 8 à 12 feuilles Sésamie

Des captures importantes sont intervenues dans les différents secteurs.

*Les préconisations du bulletin précédent sont confirmées :*

- Dans les situations concernées, la **1ère intervention à demi-dose** est à effectuer **dès que possible**, avant la fin de la semaine ;

- Dans le cas de **l'intervention unique**, celle-ci est à prévoir du **8 au 13** (en début de période si de fortes températures sont à nouveau observées) ;

- Remarque pour la **Vienne** : Pour les rares parcelles concernées, les indications du modèle conduisent à préconiser la première intervention à **demi-dose du 06 au 09 juin** ; dans le cas de **l'intervention unique**, celle-ci est à prévoir du **13 au 16** (voir prochain bulletin pour confirmation).

#### Pyrale

Des captures sont intervenues dans la plupart des pièges.

#### TOURNESOL : Stade 3 à 7


paires de feuilles

#### Pucerons

Les populations n'ont pas évolué nettement.

Les **pucerons** sont présents en **faible nombre** et une **bonne activité des auxiliaires** est notée.

*Maintenir la surveillance surtout en situations tardives.*



#### BLE

**Pucerons :**

Présence faible en général

#### MAÏS

**Sésamie :**

Poursuite du vol, intervenir si nécessaire

**Pyrale**

Début du vol

